

## LE TRAITEMENT DE RACINE

Vous venez de bénéficier d'un traitement interne de la racine, consécutif à la dévitalisation de votre dent.

Cet acte opératoire est destiné à retirer par un alésage minutieux les tissus responsables de la vitalité mais également de la sensibilité de votre dent. Ces tissus sont putrescibles, il est nécessaire de les retirer, pour assainir le ou les canaux de la dent cela permet d'éviter des lésions au niveaux de l'extrémité de la dent et au niveau du parodonte (élément de soutien de la dent) ou leur guérison.

Grâce au parodonte votre dent n'est pas « morte » elle continue à vivre dans son environnement.

La désinfection et l'obturation des canaux radicaire peuvent provoquer une irritation à l'extrémité de la dent, ceci est tout à fait réversible.

Si vous ressentez une sensibilité au niveau de votre dent lors de la mastication, il n'y pas lieu de vous alarmer. Elle sera tout à fait réversible et s'estompera spontanément en deux ou trois jours. De même, une légère rougeur de la gencive en regard de votre dent n'est pas inquiétante. Vous pouvez prendre un antalgique (paracétamol) ou un anti-inflammatoire léger (ibuprofène).

Si le ciment provisoire de surface s'effrite, il n'y a rien à craindre jusqu'à votre prochain rendez-vous. Dans quelques temps si l'obturation est trop volumineuse et si cette dent dépulpée s'assombrit nous envisagerons de la restaurer par une coiffe prothétique afin de lui rendre son anatomie, son esthétique et sa solidité.